

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -3-5-61 073379

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

12 NF

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

6ème supplément au n° 7  
Départements de l'Aveyron et de la Lozère

## INFORMATIONS CULTURES FRUITIÈRES

### TAVELURES DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

A la suite des pluies récentes, la maladie risque de s'étendre rapidement surtout dans les vergers des vallées peu aérées. La protection des fruits doit être réalisée.

Utiliser l'un des produits recommandés par la nomenclature reproduite dans notre édition spéciale.

### OIDIUM DU POMMIER

L'Oïdium s'est très largement développé sur les arbres de certaines variétés. Il est absolument nécessaire de lutter énergiquement par des traitements répétés au Soufre micronisé ou au Karathane.

Les traitements au Soufre permettent une lutte simultanée contre l'Oïdium et la Tavelure.

### PUCERONS et PSYLLES

Ces insectes piqueurs peuvent être facilement éliminés par l'emploi d'insecticides "systémiques".

## INFORMATIONS POMME DE TERRE

### MILDIOU

Les rares cultures de primeurs doivent faire l'objet de pulvérisation à partir du moment où les hampe florales sont apparentes.

P.1.372

INFORMATIONS VIGNE

MILDIOU

Toutes les conditions sont réunies pour permettre la formation de foyers primaires. Les chutes d'eau ont été assez importantes :

du 13 au 23 avril	Millau	65 mm
	Pailhas	60 mm
	St Christophe	71 mm
	Entraygues	68 mm

Dans les secteurs où la végétation est assez avancée, pousses de 15 à 20 cm et grappes visibles, il est prudent d'appliquer un premier traitement. Ce dernier est indispensable dans les zones où l'eau a séjourné en flaques.

BLACK-ROT

Les vignes ayant subi des attaques de Black-rot les années précédentes (vallées du Lot et de l'Aveyron) doivent recevoir un traitement protecteur.

Utiliser l'un des produits conseillés contre le Mildiou de la vigne.

CIGARIER

Ces insectes enroulent les feuilles de vigne en cigare. Dans les vignes où des dégâts sont visibles, il y a lieu d'effectuer un traitement. Les produits suivants sont efficaces : D.D.T. , H.C.H. , Lindane, Chlordane, Parathion, Aldrine.

OIDIUM

Les conditions climatiques du printemps ont été favorables au développement de la maladie. Or l'un des principes essentiels de la lutte contre l'oïdium réside dans le fait suivant : il faut traiter tôt.

En conséquence, pour les vignes qui seront traitées contre le Mildiou ou le Black-rot, il est conseillé d'incorporer du Soufre mouillable à la bouillie.

Dans les vignes très sensibles on emploiera le Soufre en poudrage.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON et R. MARIO

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,

P.BERVILLE